


Temat : Choroby przenoszone drogą płciową. - (11.05.2020r)

1. Choroby przenoszone drogą płciową, zwane dawniej wenerycznymi, należą do najczęściej występujących chorób zakaźnych.
2. W niektórych krajach są one główną przyczyną niepłodności kobiet.
3. Największą zapadalność obserwuje się wśród ludzi młodych, w wieku 15–24 lat.
4. Główną przyczyną szerzenia się chorób przenoszonych drogą płciową jest:
 - wczesna inicjacja,
 - częste zmiany partnerów,
 - kontakty przygodne,
 - nietypowe preferencje seksualne.
5. Choroby przenoszone drogą płciową mogą być powodowane przez wszystkie rodzaje drobnoustrojów chorobotwórczych: bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby, a także niektóre pasożyty skóry, jak wesz łonowa czy świerzbowiec, oraz pasożyty przewodu pokarmowego – owsiki.
6. Zmiany chorobowe mogą być ograniczone tylko do narządów płciowych (np. rzęsistkowica) lub mogą przybrać postać uogólnionych zakażeń, dotyczących wielu narządów lub całego organizmu (kiła, wirusowe zapalenie wątroby typu B).
7. Większość chorób przenoszonych drogą płciową daje się skutecznie leczyć. Dotyczy to szczególnie chorób bakteryjnych.
8. O wiele trudniejsze w leczeniu są schorzenia wirusowe; niektóre z nich są praktycznie nieuleczalne, leki mogą jedynie łagodzić objawy.
9. Jakie znamy choroby przenoszone drogą płciową (choroby weneryczne):
 - **Rzeżączka**- jest to bakteryjna choroba dróg moczowych i płciowych, występująca najczęściej jako zakażenie miejscowe, dotyczące narządów płciowych lub gardła. Powoduje ją dwoinka rzeżączki. Jest chorobą bardzo zakaźną;

Zapalenie spojówek




zapalenie gardła



- **Kiła**- jest to choroba zakaźna wywołana przez bakterię krętek białej. Cechuje się wieloletnim przebiegiem i naprzemiennie występującymi okresami objawowymi i bezobjawowymi. Nieleczona może atakować wszystkie narządy. Kobieta w ciąży, chora na kiłę, może zarazić swoje dziecko; kiła wrodzona może być przyczyną śmierci płodu lub urodzenia dziecka z licznymi objawami chorobowymi, jak rozległe zmiany skórne, kostne, głuchota czy utrata wzroku. Badania w kierunku kiły (tzw. odczyn Wassermanna) wykonuje się obowiązkowo wszystkim kobietom ciężarnym;



- **Chlamydiozy**- wywoływane są przez podobne do bakterii chlamydie, które są przyczyną licznych schorzeń: zapaleń cewki moczowej, najądrzy i gruczołu krokowego u mężczyzn, szyjki macicy i przydatków (jajniki i jajowody) u kobiet, zapalenia spojówek, gardła, odbytu, a także zapalenia płuc u noworodków; są szczególnie groźne, gdyż często przebiegają bezobjawowo – osoba zakażona nie wie, że choroba postępuje;



- **Kłykciny kończyste**- jest to jedna z najczęściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową. Liczba zakażeń, szczególnie wśród ludzi młodych, stale rośnie; choroba objawia się występowaniem kalafiorowatych brodawek w obrębie narządów płciowych i odbytu. Zmiany, mimo leczenia, mogą utrzymywać się przez lata i mają charakter nawracający. Zdarza się, że zakażenie przebiega bezobjawowo; jest wtedy szczególnie groźne, może bowiem prowadzić do wystąpienia nowotworów. Zakażenie wirusem;
- **Rzęsistkowica**- choroba powodowana przez pierwotniaka o nazwie rzęsistek pochwy. Uważana jest za najczęściej na świecie występującą chorobę przenoszoną drogą płciową; Rzęsistkowica może przebiegać bezobjawowo, lecz najczęściej daje objawy zapalenia pochwy z obfitymi upławami, którym towarzyszy świąd i pieczenie sromu. Dolegliwości nasilają się w trakcie miesiączki;
- **Grzybice**- istnieje kilkanaście gatunków grzybów drożdżopodobnych, powodujących u kobiet grzybicę sromu i pochwy, zaś u mężczyzn zapalenie żołądki i napletka; jest często uporczywą, przewlekłą chorobą o zróżnicowanych objawach;
- **Opryszczka narządów płciowych**- jest to choroba wirusowa o przebiegu podobnym jak opryszczka wargowa. Zmiany pojawiają się w obrębie narządów płciowych i

odbytu; mają postać drobnych pęcherzyków usadowionych na zaczerwienionej skórze, które pękając tworzą nadżerki, pokrywające się następnie strupem. Opryszczka cechuje się skłonnością do nawrotów – człowiek zakażony pozostaje nosicielem przez całe życie. Zakażenie następuje przez bezpośredni kontakt z wydzieliną zawierającą cząstki wirusa. Opryszczka genitalna u kobiet ciężarnych stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla dziecka. Zakażenie wewnątrzmaciczne grozi poronieniem, obumarciem lub nieprawidłowym rozwojem płodu;



- **Wirusowe zapalenie wątroby typu B,C,D-** są schorzeniami szerzącymi się głównie poprzez kontakt z zakażoną krwią, ale także drogą kontaktów seksualnych. Najbardziej znane jest wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW-B), zwane popularnie żółtaczką wszczepienną. Choroba przebiega w sposób zróżnicowany: od postaci łagodnych do piorunującego WZW-B o dużej śmiertelności. Przewlekły stan może prowadzić do rozwoju marskości i raka wątroby. Zakażenie może przechodzić od matki do płodu podczas ciąży i porodu. Zakażeniom WZW-B można zapobiegać, stosując szczepienia ochronne;
- **AIDS-** kolejna choroba przenoszona drogą płciową; nieuleczalna.



Dlaczego o tym mówimy???

OTÓŻ- KU PRZESTRODZE- ABY ROZPOCZYNAJĄC INICJACJĘ SEKSUALNĄ BYĆ PEWNYM SWOJEGO PARTNERA, ALE JEDNOCZEŚNIE BYĆ UCZCIWYM WZGLĘDEM NIEGO!!!

KOCHAJMY MĄDRZE I Z SZACUNKIEM 😊

